

AGROMAX BOR

Numărul de înregistrare
16-12-21-F-0003



Agromax Bor este un fertilizant lichid cu Bor complexat cu etanolamină, pentru tratament foliar și prin fertigare, pentru corectarea sau menținerea nivelului de Bor în plante și sol.

Înregistrat Și Fabricat De:

INTROLAB (PTY) LTD

(Reg. No. 2005/039779/07)

12 Oudepont Street, Wellington Industrial Park
Wellington, South Africa, 7655
Tel: +27 21 8642145/6 | Email: info@introlab.co.za



CONȚINUT DE INGREDIENTE ACTIVE:

Boron	(B)	150 g/L	15%
-------	-----	---------	-----

Distribuitor:

SC AGRODOR-SUCCES SRL

Drumul Național R1, km 14,8
r-ul. Strășeni, s. Cojușna, R.
Tel: +373 237 92 068
Email: agrodor.succes@gmail.com
www.agrodor.md



AGROMAX BOR

DESCRIEREA PRODUSULUI:

- Agromax Bor este un îngrășământ lichid, ce conține bor, cu o formulă special concepută pentru perioade în care necesitatea de bor a plantei este ridicată.
- Agromax Bor este ideal pentru:
 - Aplicare foliară
 - Fertigare

PRECAUȚII:

- Nu consumați hrană, lichide, nu fumați în timp ce lucrați cu amestecul pentru stropit.
- A se evita contactul cu ochii prin purtarea echipamentului corespunzător de protecție a feței.
- Preveniți contaminarea alimentelor, băuturilor, apei potabile și a tacâmurilor.
- Se va evita contaminarea surselor de apă potabilă pentru animale.

AVERTISMENTE:

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, departe de alimente.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor, persoanelor neinformate și animale.
- Nu folosiți niciodată ambalajul pentru orice alt scop.

COMPATIBILITATE:

- Agromax Bor este compatibil cu majoritatea substanțelor folosite în agricultură. Totuși, este recomandabil să se facă un test de miscibilitate înainte de amestecarea cu alte substanțe.
- Dacă Agromax Bor urmează să fie amestecat cu alte remedii agricole, ar trebui să fie urmat procedurii standard de amestecare pentru substanța respectivă.

- Agromax Bor ar trebui preferabil să fie aplicat dimineața devreme sau seara.
- Nu aplicați Agromax Bor în perioadele de umiditate sau stres termic.
- Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este calibrat în mod corespunzător, în stare bună de funcționare.
- Asigurați-vă ca echipamentul de pulverizare să fie curat, duzele să fie în stare bună de funcționare.
- Folosiți întotdeauna apă curată, fără impurități organice.

Cu toate că acest produs a fost testat extensiv într-o mare varietate de condiții, titularul înregistrării nu garantează că acesta va fi eficace în toate condițiile, deoarece acțiunea și efectul acestora pot fi afectate de factori cum ar fi starea anormală a solului, condițiile climatice și acelea de depozitare, calitatea apei, compatibilitatea cu alte substanțe, precum și de metoda, timpul și precizia de aplicare. În plus, titularul înregistrării nu își asumă responsabilitatea pentru daunele produse culturilor, vegetației, mediului înconjurător, oamenilor sau animalelor, sau pentru lipsa de performanță a produsului în cauză, din cauza imposibilității utilizatorului de a urma instrucțiunile de pe etichetă sau la apariția unor condiții, care nu ar fi putut fi prevăzute la înregistrare. Consultați furnizorul în cazul oricărei incertitudini.

- Pentru rezultate optime Agromax Bor trebuie utilizat în combinație cu alte îngrășăminte, ca parte a unui program de fertilizare echilibrat.
- Dozele mai mici trebuie să fie utilizate pentru întreținere în timp ce dozele mai mari ar trebui să fie folosite pentru a corecta deficiențele nutriționale.
- Utilizați doze mai mici la plantele tinere și creșteți doza pentru plantele mature.

DOZA RECOMANDATĂ: Aplicarea foliară

CULTURA	NORMA DE CONSUM, LT/HA	MODUL ȘI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZA/ NUMARUL DE TRATAMENTE
Culturi de câmp: Rapiță, grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, lucernă, Pășuni,	1L	Se aplică prin stropit, chiar înainte de înflorire, atunci când cererea de bor este mare Se aplică la intervale de timp de 14 zile după necesitate.	3
Legume: Salata verde, fasole, varză, fam.cucurbitacee, usturoi, ceapa, ardei, mazare, roșii, țelină, sfeclă roșie, morcov, căpșuni, sfeclă de zahăr	1L	Se aplică prin stropit, chiar înainte de înflorire, atunci când cererea de bor este mare Se aplică la intervale de timp de 14 zile după necesitate.	-/3
Semănțoase și simbuoase: Mere, pere, nectarine, piersici, prune, cireșe, caise Nucifere: Migdale, nuc, alun Alte: Struguri.	1-2L	Se aplică prin stropit, chiar înainte de înflorire și se repetă în perioada post-recoltare. Se aplică atunci când cererea pentru Bor este mare, cu intervale de 14 zile.	-/3