

# AGROMAX FRUCT

Numărul de înregistrare  
16-12-21-F-0003



**Agromax Fruct** este un îngrășământ lichid complexat care conține potasiu și fosfor, adecvat pentru aplicare foliară pentru a corecta sau de a menține nivelul de potasiu și fosfor în plante.

## Înregistrat Și Fabricat De:

### INTROLAB (PTY) LTD

(Reg. No. 2005/039779/07)

12 Oudepont Street, Wellington Industrial Park  
Wellington, South Africa, 7655  
Tel: +27 21 8642145/6 | Email: info@introlab.co.za

 **Introlab** [www.introlab.co.za](http://www.introlab.co.za)  
outperform the norm

## CONȚINUT DE INGREDIENTE ACTIVE:

Potasiu	(K2O)	403g/L	40,3%
Fosfor	(P2O5)	308g/L	30,8%

## Distribuitor:

### SC AGRODOR-SUCCES SRL

Drumul Național R1, km 14,8  
r-ul. Strășeni, s. Cojușna, R.  
Tel: +373 237 92 068  
Email: agrodor.succes@gmail.com  
[www.agrodor.md](http://www.agrodor.md)

 **AGRODOR**

# AGROMAX FRUCT

## DESCRIEREA PRODUSULUI:

- Agromax Fruct este un îngrășământ lichid complexat care conține potasiu și fosfor special formulat pentru a fi utilizate în etapa de colorare a fructelor.
- Agromax Fruct nu conține azon.
- Agromax Fruct este ideal pentru:
  - Aplicații foliare

## PRECAUȚII:

- Nu consumați hrană, lichide, nu fumați în timp ce lucrați cu amestecul pentru stropit.
- A se evita contactul cu ochii prin purtarea echipamentului corespunzător de protecție a feței.
- Preveniți contaminarea alimentelor, băuturilor, apei potabile și a tacâmurilor.
- Se va evita contaminarea surselor de apă potabilă pentru animale.

## AVERTISMENTE:

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, departe de alimente.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor, persoanelor neinformate și animale.
- Nu folosiți niciodată ambalajul pentru orice alt scop

## COMPATIBILITATE:

- Agromax Fruct este compatibil cu cele mai multe remedii agricole, este totuși recomandabil să se facă un test de compatibilitate înainte de amestecarea cu alte produse.
- Dacă Agromax Fruct, care urmează să fie amestecat cu alte remedii agricole, ar trebui să fie urmat procedurii standard de amestecare pentru substanța respectivă.
- Nu amestecați Agromax Fruct cu produse care conțin calciu.

- Agromax Fruct ar trebui preferabil să fie aplicat dimineața devreme sau seara.
- Nu aplicați Agromax Fruct pe plante care sunt supuse perioadelor de umiditate sau de stres termic.
- Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este calibrat în mod corespunzător, în stare bună de funcționare.
- Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este curat, duzele sunt în stare bună de funcționare și fără resturi de alte produse.
- Folosiți întotdeauna apă curată.

---

Cu toate că acest produs a fost testat extensiv într-o mare varietate de condiții, titularul înregistrării nu garantează că acesta va fi eficace în toate condițiile, deoarece acțiunea și efectul acestora pot fi afectate de factori cum ar fi starea anormală a solului, condițiile climatice și acelea de depozitare, calitatea apei diluante, compatibilitatea cu alte substanțe, precum și de metoda, timpul și precizia de aplicare. În plus, titularul înregistrării nu își asumă responsabilitatea pentru daunele produse culturilor, vegetației, mediului înconjurător, oamenilor sau animalelor, sau pentru lipsa de performanță a produsului în cauză, din cauza imposibilității utilizatorului de a urma instrucțiunile de pe etichetă sau la apariția unor condiții, care nu ar fi putut fi prevăzute la înregistrarea. Consultați furnizorul în cazul oricărei incertitudini.

---

- Pentru rezultate optime Agromax Fruct trebuie utilizat în combinație cu alte îngrășăminte, ca parte a unui program de fertilizare echilibrat.
- Dozele mai mici trebuie să fie utilizate pentru întreținere în timp ce dozele mai mari ar trebui să fie folosite pentru a corecta deficiențele nutriționale.
- Utilizați doză mai mică pentru plantele tinere și creșteți doza pentru plantele mature.

## DOZA RECOMANDATĂ: Aplicarea foliară

CULTURA	NORMA DE CONSUM, LT/HA	MODUL SI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZA/ NUMARUL DE TRATAMENTE
<b>Culturi de câmp:</b> Rapiță, grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, lucernă, Pășuni,	<b>3-5L</b>	Se aplică ca un spray de acoperire completă în fazele reproductive ale culturii. Aplicați la un interval de 14 zile după necesitate.	<b>1-2</b>
<b>Legume:</b> Salata verde, fasole, varză, fam.cucurbitacee, usturoi, ceapa, ardei, mazăre, roșii, țelină, sfedă roșie, morcov, căpșuni.	<b>5-7 L</b>	Se aplică ca un spray de acoperire completă în fazele reproductive ale culturii. Aplicați la un interval de 14 zile după necesitate.	<b>1-2</b>
<b>Semănțoase și simbuoase:</b> Mere, pere, nectarine, piersici, prune, cireșe, caise <b>Nucifere:</b> Migdale, nuc, alun <b>Alte:</b> Struguri.	<b>5-10 L</b>	Aplicați de două ori. Prima – cu 4-5 săptămâni până la recoltate și a 2-a peste 2-3 săptămâni mai târziu. Aplicați ca un spray de acoperire totală.	<b>2</b>