

AGROMAX

ZINC

Numărul de înregistrare
16-12-21-F-0003



Agromax Zinc este un îngrășământ lichid - suspensie concentrată adecvat pentru aplicare foliară, cu scopul de a corecta sau de a menține nivelurile de zinc în plante.

Înregistrat Și Fabricat De:

INTROLAB (PTY) LTD

(Reg. No. 2005/039779/07)

12 Oudepont Street, Wellington Industrial Park
Wellington, South Africa, 7655
Tel: +27 21 8642145/6 | Email: info@introlab.co.za

 **Introlab** www.introlab.co.za
outperform the norm

CONȚINUT DE INGREDIENTE ACTIVE:

Zinc	(Zn)	700 g/L	70 %
------	------	---------	------

Distribuitor:

SC AGRODOR-SUCCES SRL

Drumul Național R1, km 14,8
r-ul. Strășeni, s. Cojușna, R.
Tel: +373 237 92 068
Email: agrodor.succes@gmail.com
www.agrodor.md

 **AGRODOR**

AGROMAX

ZINC

DESCRIEREA PRODUSULUI:

- Agromax Zinc este un îngrășământ lichid, sub formă de suspenzie concentrate, destinată pentru aplicare foliară, în perioadele de cerere sporită de zinc.
- Agromax Zinc nu conține nitrogen și clor.
- Agromax de zinc este ideal pentru:
 - Aplicare foliară

PRECAUȚII:

- Nu consumați hrană, lichide, nu fumați în timp ce lucrați cu amestecul pentru stropit.
- A se evita contactul cu ochii prin purtarea echipamentului corespunzător de protecție a feței.
- Preveniți contaminarea alimentelor, băuturilor, apei potabile și a tacâmurilor.
- Se va evita contaminarea surselor de apă potabilă pentru animale.

AVERTISMENTE:

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, departe de alimente.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor, persoanelor neinformate și animale.
- Nu folosiți niciodată ambalajul pentru orice alt scop.

COMPATIBILITATE:

- Agromax Zinc este compatibil cu cele mai multe remedii agricole, este totuși recomandabil să se facă un test de compatibilitate înainte de amestecarea cu alte substanțe.
- Nu amestecați Agromax Zinc cu produse ce conțin fosfor.
- Dacă Agromax Zinc urmează a fi amestecat cu alte remedii agricole, ar trebui să fie urmat procedura standard de amestecare pentru substanța respectivă.

- Agromax Zinc ar trebui să fie aplicat dimineața devreme sau după-amiaza târziu.
 - Nu aplicați Agromax Zinc pe plantele care sunt supuse perioadelor de umiditate sau de stres termic.
 - Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este calibrat în mod corespunzător, în stare bună de funcționare.
 - Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este curat, duzele sunt în stare bună de funcționare și fără alte produse înainte de utilizare.
 - Folosiți întotdeauna apă curată, care este liber de material organic.
-

Cu toate că acest produs a fost testat extensiv într-o mare varietate de condiții, titularul înregistrării nu garantează că acesta va fi eficient în toate condițiile, deoarece acțiunea și efectul acestora pot fi afectate de factori cum ar fi starea anormală a solului, condițiile climatice și cele de depozitare, calitatea apei diluante, compatibilitatea cu alte substanțe, precum și de metoda, timpul și precizia de aplicare. În plus, titularul înregistrării nu își asumă responsabilitatea pentru daunele produse culturilor, vegetației, mediului înconjurător, oamenilor sau animalelor, sau pentru lipsa de performanță a produsului în cauză, din cauza imposibilității utilizatorului de a urma instrucțiunile de pe etichetă sau la apariția unor condiții, care nu ar fi putut fi prevăzute la înregistrare. Consultați furnizorul în cazul oricărei incertitudini.

- Pentru rezultate optime Agromax Zinc trebuie utilizat în combinație cu alte îngrășăminte, ca parte a unui program de fertilizare echilibrat.
- Dozele mai mici trebuie să fie utilizate pentru întreținere în timp ce doze mai mari ar trebui să fie folosite pentru a corecta deficiențele nutriționale.
- Utilizați doze mai mici de pe plantele tinere și mai mari la plantele mature.

DOZA RECOMANDATĂ: Aplicarea foliară

CULTURA	NORMA DE CONSUM, LT/HA	MODUL SI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZA/ NUMARUL DE TRATAMENTE
Culturi de câmp: Rapiță, grâu, porumb, floarea-soarelui sfeclă de zahăr, soia, cartofi, lucernă, Pășuni,	1-2 L	Se aplică ca un spray de acoperire completă chiar înainte de înflorire, atunci când cererea de zinc este mare Se aplică la intervale de timp de 14 zile după necesitate.	2
Legume: Salata verde, fasole, varză, fam.cucurbitacee, usturoi, ceapa, ardei, mazăre, roșii, țelină, sfeclă roșie, morcov, căpșuni.	1-2 L	Se aplică ca un spray de acoperire completă chiar înainte de înflorire, atunci când cererea de zinc este mare Se aplică la intervale de timp de 14 zile după necesitate.	2
Semănțoase și simbuoase: Mere, pere, nectarine, piersici, prune, cireșe, caise Nucifere: Migdale, nuc, alun Alte: Struguri.	3-5 L	Se aplică ca un spray de acoperire la desfacerea mugurilor și se repetă la 14 zile după căderea petalelor. Se aplică în cazul în care cererea de zinc, este mare, cu intervale de 14 zile.	2-3